

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-81/2010d z dnia 22.03.2010 r.
zmieniającej zezwolenie MRiGŻ nr 506/99 z dnia 25.03.1999 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska,
tel.: (+41,61) 323-11-11, fax: (+41,61) 323-12-12.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: 22 326-06-01,
fax: 22 326-06-99.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

A C T A R A 2 5 W G

Zawartość substancji aktywnej:

tiametoksam 3-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro)
amina; związek z grupy neonikotynoidów – **25% w 1 kg środka.**

**Zezwolenie MRiGŻ Nr 506/99 z dnia 25.03.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr 19/2002 z dnia 19.04.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-15/2003/p z dnia 27.06.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW nr R- 439/2007 z dnia 18.10.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R- 47/2009 z dnia 18.03.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-81/2010d z dnia 22.03.2010 r.**

Działalność jest toksycznie na pszczoły.



Niebezpieczny dla środowiska



Uwaga!

- Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie granул do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku oraz szkodników ssących i gryzących w roślinach sadowniczych.

Na roślinie działa powierzchniowo, wglębnie i systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) ZIEMNIAK

larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. ROŚLINY SADOWNICZE

A) DRZEWA ZIARNKOWE

kwieciak jabłkowiec

Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.

Opryskiwać tuż przed pękaniem lub w trakcie pękania pąków.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

owocnica jabłkowa

Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.

Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

mszyca jabłoniowa

Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.

Opryskiwać na początku wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż w ostatniej fazie opadania płatków kwiatowych.

bawełnica korówka

Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce.

miodówka gruszowa plamista

Zalecana dawka: 0,16-0,2 kg/ha.

Środek stosować najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia drzew lub po zakończeniu kwitnienia.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

B) CZARNA PORZECZKA

mszyce

Zalecana dawka: 0,1 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

UWAGI:

1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.
 - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.
 - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
4. W przypadku zwalczania miodówki gruszowej plamistej do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

ZIEMNIAK – 14 DNI,

DRZEWA ZIARNKOWE – 21 DNI,

PORZECZKA CZARNA – 28 DNI.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

10 DNI

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 1/4 pojemności (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu;

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0–30°C.

Chronić przed wilgocią.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Rzeszów – (17) 866 44 09

Kraków - (12) 411 99 99

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 26 76

Warszawa – (22) 619 08 97

Łódź – (42) 657 99 00

Wrocław – (71) 343 30 08

Poznań – (61) 847 69 46

Tarnów – (14) 631 54 09

Okres ważności – 3 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -