

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”, SA, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, tel. (032) 616 44 42, fax.(032) 616 24 17, www.azot.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową oraz roślin ozdobnych przed fuzariozą.

Zawartość substancji aktywnej:

kaptan – 50% N-(trichlorometylotio)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid
(związek z grupy ftalimidów)



Zezwolenie MRIRW Nr R -35/2007 z dnia 03.08. 2007 r.



Szkodliwy

Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze.

Środek można stosować podczas całego sezonu wegetacyjnego.

jabłoń, grusza

- parch jabłoni, parch gruszy

zalecana dawka: 3kg/ha

Zalecana ilość wody: 600l/ha

Środek stosować zapobiegawczo co 7 dni od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości.

wiśnia

- gorzka zgnilizna wiśni

Zalecana dawka : 3 kg/ha

Zalecana ilość wody : 500-750 l/ha

Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości koron drzew.

Środek stosować zapobiegawczo po 3 tygodniach po kwitnieniu co 10 – 14 dni.

Rośliny warzywne:

fasola szparagowa

- antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń

Zalecana dawka : 1,2 kg/ha

Zalecana ilość wody : 700 l/ha

Opryskiwać 2 razy po wschodach roślin co 10 dni oraz 2 razy w okresie formowania strąków co 7-10 dni.

Rośliny ozdobne.

narcyz, tulipan, mieczyk (moczenie)

fuzarioza

Zalecane stężenie : 0,5 - 1% (500-1000 g środka w 100 litrach wody)

Przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut w cieczy użytkowej.

OKRES KARENCEJ (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) : **jabłka, gruszki, wiśnie, fasola szparagowa - 7 dni.**

rośliny ozdobne – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) – **NIE DOTYCZY**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM : BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (058) 301 65 16
Kraków – (012) 411 99 99
Lublin – (081) 740 26 76
Łódź – (042) 657 99 00
Poznań – (061) 847 69 46

Rzeszów - (017) 866 44 09
Sosnowiec – (032) 266 11 45
Warszawa – (022) 619 08 97
Wrocław – (071) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -.....
Zawartość netto -.....
Nr partii -.....